

## DOPLNĚNÍ METODIK INTEGROVANÉ PRODUKCE PRO ROK 2014

### Nová registrace přípravku k 3.7.2014:

**Fungicid LUNA EXPERIENCE, účinná látka** Tebuconazole, Fluopyram

Registrant: Bayer S.A.S. , Registrační číslo: 4979-0 , Konec platnosti rozhodnutí : 1.8.2019

Plodina <i>Oblast použití</i>	Škodlivý organismus	Dávkování,	Ochranná lhůta	Poznámka
Jabloň hrušeň	Strupovitost, Padlí jabl. Nectriová rakovina	0,5 – 0,75 l/ha (0,25 l na 1 m koruny/ha)	14 dnů	od 57 BBCH do 81 BBCH
Jabloň hrušeň	Skládkové choroby jádrovin	0,5 – 0,75 l/ha (0,25 l na 1 m koruny/ha)	14 dnů	od 85 BBCH do 87 BBCH
Třešeň, višeň	Moniliová spála, Moniliová hniloba, Skvrnitost listů třešně, Koletotrichová hniloba třešně	0,4 – 0,6 l/ha (0,2 l na 1 m koruny/ha)	7 dnů	od 59 BBCH do 87 BBCH
Broskvoň	Moniliová hniloba	0,5 l/ha (0,25 l na 1 m koruny/ha)	7 dnů	od 81BBCH do 87 BBCH

Plodina <i>Oblast použití</i>	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
jabloň hrušeň	300 – 1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny)	Rosení, postřik	Max. 1x/rok při dávce 0,75 l/ha Max. 2x/rok při dávce 0,5 l/ha	21 dnů
třešeň višeň	300 – 1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny)	Rosení, postřik	Max. 1x/rok při dávce 0,6 l/ha Max. 2x/rok při dávce 0,4 l/ha	21 dnů
broskvoň	300 – 1500 l/ha (max. 500 l/1 m výšky koruny)	Rosení, postřik	Max. 2x/rok	21 dnů

Zpracováno dle registračních údajů ÚKZÚZ.

Holovousy 16.7.2014

Připravil: Ing. M. Lánský