

Movento 100 SC

evidenční číslo: 5110-0

účinná látka: spirotetramat 100 g/l

platnost povolení končí dne: 30. 4. 2025

Rozsah povoleného použití přípravku:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
cibulovité okrasné rostliny, okrasné rostliny	mšice	0,75 l/ha	AT	1) od: 69 BBCH, do: 89 BBCH, mimo období kvetení	
ovocné dřeviny okrasné dřeviny	mšice	0,75 l/ha	-	1) mimo období kvetení	5) školky
réva	mšička révokaz	0,5-0,7 l/ha	14	1) od: 69 BBCH, do: 81 BBCH	5) školky, mladé výsadby, podnožové vinice
réva	pidikřísek révový, křísek révový	0,5-0,7 l/ha	14	1) od: 60 BBCH, do: 81 BBCH	5) školky, mladé výsadby, podnožové vinice
angrešt, bez černý, borůvka	mšice	0,75 l/ha	AT	1) po sklizni	
meruňka, třešeň, višeň, broskvoň, slivoň	puklice švestková	2,25 l/ha (0,75 l/1 m výšky koruny/ha)	21	1) od: 69 BBCH, do: 81 BBCH	

mrkev, celer bulvový, pastinák, petržel	mšice, dutilka hlohová	0,45-0,75 l/ha	21	1) od: 12 BBCH, do: 49 BBCH	
čekanka salátová listová	mšice, dutilka topolová	0,45-0,75 l/ha	7	1) od: 13 BBCH, do: 49 BBCH	
endívie širokolistá	dutilka topolová	0,75 l/ha	7	1) od: 13 BBCH, do: 49 BBCH	

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

(-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
angrešt	500-1000 l/ha	postřik, rosení	2x /rok	14 dnů
bez černý	500-1000 l/ha	postřik, rosení	2x /rok	14 dnů
borůvka	500-1000 l/ha	postřik, rosení	2x /rok	14 dnů
broskvoň	500-1500 l/ha	postřik, rosení	2x /rok	14 dnů
celer bulvový	200-500 l/ha	postřik	2x	14 dnů
cibulovité okrasné rostliny	200-800 l/ha	postřik, rosení	2x /rok	14 dnů
čekanka salátová	200-500 l/ha	postřik	2x	14 dnů
endívie širokolistá	500 l/ha	postřik	1x	
meruňka	500-1500 l/ha	postřik, rosení	2x /rok	14 dnů
mrkev	200-500 l/ha	postřik	2x	14 dnů
okrasné dřeviny	200-800 l/ha	postřik, rosení	2x /rok	14 dnů
okrasné rostliny	200-800 l/ha	postřik, rosení	2x /rok	14 dnů
ovocné dřeviny	200-800 l/ha	postřik, rosení	2x /rok	14 dnů
pastinák	200-500 l/ha	postřik	2x	14 dnů
petržel	200-500 l/ha	postřik	2x	14 dnů

réva	1000 l/ha	postřik, rosení	2x /rok	14 dnů
slivoň	500-1500 l/ha	postřik, rosení	2x /rok	14 dnů
třešeň	500-1500 l/ha	postřik, rosení	2x /rok	14 dnů
višeň	500-1500 l/ha	postřik, rosení	2x /rok	14 dnů

Pro použití do plodin třešeň, višeň:

V dávce 2,25 l přípravku/ha (tedy při výšce koruny 3 m) lze přípravek aplikovat pouze při použití intervalu mezi aplikacemi 21 dní.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
okrasné rostliny nad 150 cm, ovocné a okrasné školky, meruňka, třešeň, višeň, broskvoň, slivoň	6	6	6	6