



**ČR - Státní rostlinolékařská správa**, organizační složka státu  
SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN  
ODBOR KOORDINACE HODNOCENÍ  
Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

VYTVOŘIL/TELEFON: Ing. Alena Kolouchová / 545 110 477

E-MAIL: [alena.kolouchova@srs.cz](mailto:alena.kolouchova@srs.cz)

DATUM: 5.4.2013

čj.: SRS 019443/2013

**5. ROZŠÍŘENÉ POUŽITÍ POVOLENÉHO PŘÍPRAVKU NEBO ZMĚNA V ROZŠÍŘENÉM POUŽITÍ PŘÍPRAVKU tzv. „minority“ (= menšinová použití)**

**a) rozhodnutí vydaná držiteli povolení k přípravku**

**ANTRE 70 WG**

**držitel rozhodnutí o povolení: Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel Str. 50, 40789 Monheim, Germany**

**registrační číslo: 4718-0**

**účinná látka: propineb 700 g/kg**

**platnost povolení končí dne: 31.3.2014**

**1) rozsah povoleného použití:**

| 1) Plodina, oblast použití | 2) Škodlivý organismus, jiný účel použití | Dávkování, mísitelnost                                                                                                                                                           | OL | 3) Poznámka                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------|
| jádroviny                  | strupovitost                              | 0,65-0,75 kg / 1m výšky koruny/ha (max. 2,25 kg/ha)                                                                                                                              | AT | 1) do BBCH 69 (ukončené kvetení), max. výška olistění 3m<br>3) max. 2x    |
| réva                       | plíseň réвовá                             | 0,8-1 kg/ha do BBCH 61 (počátek kvetení), max. 500 l vody /ha (min. koncentrace 0,2%);<br>1,6-2 kg/ha od BBCH 61 (počátek kvetení), max. 1000 l vody /ha (min. koncentrace 0,2%) | 28 | 3) max. 2x                                                                |
| réva                       | černá skvrnitost                          | 2 kg/ha                                                                                                                                                                          | AT | 1) od BBCH 05 (stadium vlny), do BBCH 13 (3 vyvinuté listy)<br>3) max. 2x |
| réva                       | červená spála                             | 1,5 kg/ha do BBCH 71 (nasazování bobulí), max. 750 l vody /ha (min. koncentrace 0,2%)<br>2 kg/ha od BBCH 71 (nasazování bobulí), max. 1000 l vody /ha (min. koncentrace 0,2%)    | 28 | 3) max. 2x                                                                |

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní (přípravek lze aplikovat nejpozději do růstové fáze jaderovin BBCH 69).

Maximální počet ošetření: jádroviny 2 x za vegetační sezónu,  
réva 2 x za vegetační sezónu.

Dávka aplikační kapaliny: jádroviny 200 – 1000 l / ha

réva 200 – 1000 l / ha

Interval mezi ošetřeními: jádroviny 7 – 14 dní

réva 7 – 14 dní

Nižší dávka v rámci uvedeného rozmezí se použije při menším ohrožení porostu a při kratším intervalu mezi ošetřeními.

## **2) Rozsah rozšířeného použití dle čl. 51 nařízení:**

### **Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009**

| 1) Plodina,<br>oblast použití.<br>rajče | 2) Škodlivý organismus,<br>jiný účel použití<br>hnědá skvrnitost rajčat,<br>čerň rajčatová, septorióza<br>rajčat | Dávkování,<br>mísitelnost<br>2,25 kg/ha | OL | 3) Poznámka                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----------------------------|
| rajče                                   | hnědá skvrnitost rajčat,<br>čerň rajčatová, septorióza<br>rajčat                                                 | 2,25 kg/ha                              | 7  | 1) skleníky,<br>fóliovníky |
| třešeň, višně                           | skvrnitost listů třešně,<br>strupovitost peckovin,<br>suchá skvrnitost listů<br>peckovin                         | 2,25 kg/ha                              | 28 | 1) pole                    |

Použití preventivně, na počátku infekce dle prognózy a signalizace, max. 2x za sezónu.

U rajčete v BBCH 14 - 85, max. 600 - 1000 l vody/ha, interval mezi ošetřeními: 7dní.

U třešně a višně v BBCH 59 - 72, max. 300 - 1000 l vody/ha, interval mezi ošetřeními:10 -14dní

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně osoba používající přípravek.

## **3) Další společné pokyny pro použití přípravku:**

Přípravek se aplikuje rosením nebo postřikem schválenými pozemními aplikátory.

Při aplikaci nízkých dávek vody konzultujte s držitelem povolení možný vliv zvýšené koncentrace přípravku na účinnost a plodinu.

Vzhledem k nízké hodnotě suspendovatelnosti je nezbytné míchání kapaliny během aplikace, věnujte zvýšenou pozornost čištění aplikačního zařízení.